

L-Thyroxine Christiaens: nieuwe formule vanaf 1 januari 2015 – dosisaanpassing kan nodig zijn.

Vanaf 1 januari 2015 wordt L-Thyroxine Christiaens vervangen door L-Thyroxine Christiaens nieuwe formule. Volgens de informatie u bezorgd door Takeda kan de nieuwe formulering tot een hogere blootstelling leiden. Bij aflevering van de nieuwe formule zal de apotheker de patiënt wijzen op de gewijzigde formule en adviseren hieromtrent contact op te nemen met de huisarts.

- Bij alle patiënten is ongeveer 2 maanden na overschakeling op L-Thyroxine nieuwe formule naast een klinisch nazicht een controle van het serum TSH gewenst om na te gaan of een dosisaanpassing nodig is.
- Controle van het serum TSH minder dan 2 maanden na omschakeling op L-Thyroxine nieuwe formule kan nodig zijn bij patiënten met risicofactoren* en bij patiënten met klachten of tekens van thyreotoxicose.
- Bij patiënten met risicofactoren* en een serum TSH van minder dan 1.5 mU/L bij de laatste meting onder de vorige formulering kan overwogen worden om proactief de dosis te verminderen bij de overschakeling op de nieuwe formulering, als volgt:

Dosis L-Thyroxine Christiaens "oude formule" i.e. voor wijziging	Dosisvermindering L-Thyroxine "nieuwe formule" i.e. na wijziging	
	1 risicofactor *	> 1 risicofactor *
< 100 µg	-12,5 µg	- 25 µg
100-199 µg	-25 µg	- 37,5 µg
≥ 200 µg	-37,5 µg	-50 µg

* Risicofactor(en):

- leeftijd ≥ 65 jaar
 - hartlijden (ritmeproblemen of ischemie)
- Bij patiënten met een voorgeschiedenis van een schildkliercarcinoom en/of bij zwangerschap is een evaluatie door de endocrinoloog gewenst.