

NOTICE

CYNOMEL® 0,025 mg,
liothyronine sodique

comprimé sécable

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Composition

Liothyronine sodique 0,025 mg
Excipients : sulfate de calcium dihydraté, gélatine, saccharose, amidon de blé, acide stéarique, talc, pour un comprimé sécable.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé sécable (Boîte de 30).

Classe pharmaco-thérapeutique

HORMONES THYROÏDIENNES
(Hormones – sauf sexuelles).

Nom et adresse de l'exploitant

sanofi-aventis france
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris – France
Information médicale : N° vert 0800 222 555
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Nom et adresse du fabricant

Patheon France S.A.
40, boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu – France

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est utilisé pour traiter les hypothyroïdies (sécrétion insuffisante de la glande thyroïde) et certains goitres et nodules.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- hyperthyroïdies (sécrétion excessive d'hormones thyroïdiennes),
- allergie à l'un des constituants,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten),
- intolérance au fructose, syndrome de malabsorption glucose/galactose ou déficit en sucrase-isomaltase (cf. Mises en garde spéciales).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de :

- cardiopathies décompensées (maladies sévères du cœur),
- angine de poitrine – trouble du rythme cardiaque.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

Ne pas utiliser chez les patients obèses, sauf en cas de maladie de la thyroïde.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au

fructose, de syndrome de malabsorption glucose/galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

Précautions d'emploi

La surveillance clinique et biologique du traitement doit être renforcée dans les cas suivants :

- ostéoporose sévère,
- insuffisance de fonctionnement des glandes cortico-surréaliennes,
- sujets âgés.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse – Allaitement

Ce traitement à base d'hormones thyroïdiennes doit être poursuivi pendant la grossesse sous la surveillance de votre médecin. L'allaitement est possible pendant le traitement.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Amidon de blé (gluten), saccharose.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

RESERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

La posologie est variable et sera adaptée à votre cas par votre médecin. Respectez ses recommandations.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

Ce médicament est à prendre de préférence le matin à jeun.

Durée du traitement

L'hypothyroïdie étant dans la majorité des cas une maladie définitive, le traitement doit être poursuivi indéfiniment.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de surdosage, les signes suivants peuvent apparaître : accélération du rythme cardiaque, insomnie, irritabilité, maux de tête, fièvre, sueurs, amaigrissement rapide, diarrhée. Contacter rapidement votre médecin traitant.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Si une dose a été omise, reprenez le traitement sans augmenter les doses.

Si plusieurs doses ont été omises, contactez votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- aggravation de toutes maladies cardiaques (angor, infarctus du myocarde, troubles du rythme),
- signes d'hyperthyroïdie : accélération du rythme cardiaque, insomnie, excitabilité, maux de tête, fièvre,

sueurs, amaigrissement, diarrhée,

- allergie.

En cas d'apparition d'un de ces signes, consulter immédiatement votre médecin qui adaptera les doses à votre cas.

- chez l'enfant, possibilité d'hypercalciurie (quantité excessive de calcium dans les urines).

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

Précautions particulières de conservation

A conserver à une température inférieure à + 25 ° C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Novembre 2005.